

# ***Urologische ingreep bij de jongen***



## ***Urologische ingreep bij de jongen***

### **Meneer, mevrouw**

Er werd een klein urologisch probleem vastgesteld bij uw zoon. Dit kan gaan om een vernauwde voorhuid, te kort frenulum of verklevingen.

Daardoor kan het moeilijk zijn om de voorhuid naar achter te trekken bij het wassen. Het kan ook op latere leeftijd voor pijn en ongemak gaan zorgen.

Hiervoor zijn er verschillende ingrepen mogelijk : circumcisie, Z-plastie (verbredingsplastie), frenulotomie.

Circumcisie of besnijdenis : verwijderen van de voorhuid

Z-plastie of verbredingsplastie : verbreden of verwijden van de voorhuid

Frenulotomie : verwijderen van een te kort stukje huid tussen de eikel en de schacht.

U koos in overleg met de uroloog voor de ingreep die het best past bij uw zoon.

Of u koos mogelijk voor een besnijdenis uit zuiver religieuze overtuiging. Dit gebeurt in ons ziekenhuis enkel vanaf de leeftijd van 1 jaar.

# ***Urologische ingreep bij de jongen***

## **Opname**

Uw zoon zal worden opgenomen op de dagkliniek (3de verdieping). U meldt zich daar rechtstreeks aan bij de balie om 7u. De kinderen worden als eerste op de operatieplanning gezet.

In de namiddag mag uw zoon terug naar huis.

U dient een formulier in te vullen en te ondertekenen om uw toelating te geven voor de ingreep. Dit formulier krijgt u mee wanneer u bij de uroloog op consultatie komt. Breng dit formulier samen met het opnameblad mee op de dag van de ingreep.

Eén van de ouders mag mee naar het operatiekwartier en mag bij het kindje blijven tot het in slaap is gebracht. Na de ingreep mag één ouder ook op recovery bij het kindje blijven tot het naar zijn kamer teruggebracht wordt.

De ingreep zelf duurt ongeveer 20 minuten.

Na de middag mag uw zoon terug naar huis.

## **Nazorg**

Het verbandje wordt dezelfde dag nog verwijderd op dagkliniek. De volgende dag mag het kindje douchen. Het is normaal dat de eikel gezwollen en rood ziet na de ingreep.

De hechtingen lossen vanzelf op. U krijgt een voorschrift mee voor de verzorging thuis. Het kan gaan om Isobetadine, Eosine of Terra-cortril suspensie®.

Bij een circumcisie en frenulotomie Isobetadine dermicum of Eosine 2x dag.

Bij verbredingsplastie Terracortril suspensie® 2x dag en de voorhuid telkens mobiliseren.

De volgende dag mag het kindje naar school of naar de kinderopvang.

Na één week sporten toegelaten.

Na twee weken zwemmen toegelaten.

# ***Urologische ingreep bij de jongen***

## **Controle**

U krijgt een afspraak mee voor een controle bij de uroloog, na ongeveer één maand.

## **Wanneer ons contacteren**

Roodheid en zwelling zijn normaal de eerste dagen na de ingreep.

Normaal verloopt de procedure probleemloos.

U neemt contact op met de consultatie urologie bij :

- Koorts
- Hevige pijn
- Etter
- Blijvende roodheid en forse zwelling

## **Contactgegevens**

**Dr Degelin Jurgen**  
**Dr Verlinde Bjorn**

Consultatie urologie :  
059/55 52 23

Ma : 8u30-12u 14u-18u

Di en do: 16u-19u

Woe : 14u-18u

Vrij : 8u30-12u

[www.prostaatkliniekoostende.be](http://www.prostaatkliniekoostende.be)

***az sint-jan brugge - oostende av***

Campus Henri Serruys • Kairostraat 84 • 8400 Oostende • t: 059 55 51 11 • f: 059 55  
info.oostende@azsintjan.be • [www.azsintjan.be](http://www.azsintjan.be)